Anthracnose, la brûlure de la feuille.

Types d'Anthracnose.

Il y a DEUX sortes d'infections : LA BRÛLURE DE LA FEUILLE qui se produit l'été, et LA POURRITURE BASALE, trouvée pendant le temps frais et humide.

Période d'apparition.

- Cette maladie est fortement évidente dans les mois de juin, juillet, et août, mais peut souvent exister en mai et septembre.

Espèces susceptibles.

- Le pâturin annuel et l'agrostide stolonifère, situés sur les verts, départs, et allées de terrain de golf, sont attaqués par cette maladie.

Identification.

- Cette maladie peut nuire aux racines et aux couronnes, mais elle endommagera SURTOUT LES FEUILLES.

- Pendant l'été, le gazon peut devenir COMPLÈTEMENT BRÛLÉ au cours de QUARANTE–HUIT HEURES après le commencement de conditions favorables.

- Certaines espèces, comme le pâturin annuel, peuvent subir UNE MORT RAPIDE dans la forme de TACHES OU DE PLAQUES IRRÉGULIÈRES.

- Les PLUS VIEILLES FEUILLES EXTÉRIEURES sont attaquées d'abord. Finalement, la plante entière SEMBLERA VIEILLIR RAPIDEMENT, dans un processus appelé la « *sénescence* », ou le vieillissement de la plante.

- Les feuilles deviennent infectées DU BOUT EN BAS, surtout après une tonte récente.

- Au départ, les feuilles vont FLÉTRIR ET JAUNIR. (Par rapport à la sécheresse, qui produit sa COULEUR VIOLACÉE TYPIQUE.) Le gazon perd sa vigueur.

- Dès que les feuilles sont jaunes, elles changeront rapidement à une couleur BRUN–ROUGEÂTRE MARBRÉ, OU BRONZE.

- La couleur changera encore pour une dernière fois au symptôme célèbre de ROUGE–BRUNÂTRE.