Anthracnose, la brûlure de la feuille.

Conditions favorables au développement.

- *Intempéries.* Cette maladie infectera et provoquera un dommage quand le gazon est soumis au STRESS.

Exemples :

- chaleur excessive,
- compaction forte,
- égouttement inadéquate,
- excès d'humidité,
- manque d'azote,
- ombre,
- piétinement, et
- sécheresse.

Le stress causé par les intempéries au printemps et l'été augmentera le dommage associé à cette maladie.

- *Pratiques culturales.* Les PRATIQUES D'ENTRETIEN affecteront beaucoup le développement de cette maladie.

Exemples :

- une tonte trop courte,
- une fertilisation azotée inadéquate ou excessive,
- une irrigation trop élevée,
- un milieu ombragé,
- un terreautage qui peut blesser le feuillage, et
- une forte accumulation de chaume.

Une tonte trop courte et un manque d'azote provoqueront les effets les plus prononcés pour cette maladie.

La sévérité de maladie est plus grande sur un gazon luxuriant et succulent maintenu avec de très hauts niveaux d'azote, par rapport à l'herbe maintenue avec les niveaux modérés.

- *Températures.* Des températures hautes qui sont prolongées.

IDÉALEMENT …

- les températures de jour variant de 30 à 33 °C (86 à 91 °F), et
- une température nocturne de 21 °C (70 °F).

Pourtant, le gazon peut aussi être infecté quand les températures se retrouvent entre 25 et 35 °C (77 à 95 °F).

- *Humidité.* Cette maladie se développera quand l'humidité de surface et l'humidité atmosphérique sont élevées. Le temps pluvieux et une humidité relative saturée de 100 pour cent accéléreront beaucoup le développement de cette maladie.