Anthracnose, la brûlure de la feuille.

Maîtrise chimique.

Compass MC 50WG granules dispersibles.

- *Fabricant.* Bayer Environmental Science.
- *Classification.* Fongicide du groupe 11.
- *Matière active.* Contient 50 pour cent de trifloxystrobine.
- *Mode d'action.* Un fongicide PÉNÉTRANT qui procure une action trans–laminaire grâce à son affinité élevée avec la couche cireuse de la surface de la plante, au mouvement de vapeur localisé et au dépôt de vapeur sur la plante.
- *Usage.* Un fongicide à action essentiellement PRÉVENTIVE. L'efficacité est optimale dans le cadre d'un programme PRÉVENTIF. Effectuer des applications PRÉVENTIVES lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie. Alterner avec des fongicides appartenant à d'autres groupes.
- *Fréquence d'application.* Pour une suppression PRÉVENTIVE TOUS LES 14 JOURS.
- *Taux d'application.* 3,8 grammes dans 4,1 à 8,1 litres d'eau par 100 mètres carrés, ou 0,12 once avdp par 1000 pieds carrés.
- *Contenu net.* Un paquet de 454 grammes peut traiter 130,000 pieds carrés.
- *Restrictions.* Alterner ce fongicide, ou les fongicides du même Groupe 11, avec des fongicides appartenant à d'autres groupes et qui éliminent les mêmes organismes pathogènes. Ne pas faire plus de deux applications séquentielles avant d'effectuer au moins une application d'un fongicide classifié dans un autre groupe. Ne pas appliquer plus de 2,4 kg par hectare par saison (l'équivalent de six applications). Ne pas appliquer conjointement avec des surfactants aux organo–silicates. Ne pas retourner, ni permettre le retour des travailleurs, dans la zone traitée au cours du délai de sécurité de 12 heures.

Daconil ® Ultrex.
Granules dispersables dans l'eau.

- *Fabricant.* Syngenta Canada, inc.
- *Classification.* Fongicide du groupe M.
- *Matière active.* Contient 82,5 pour cent de chlorothalonil.
- *Mode d'action.* Un fongicide de CONTACT.
- *Usage.* Ce fongicide doit être utilisé dans le cadre d'un programme PRÉVENTIF de suppression des maladies. Les traitements curatifs NE SONT PAS recommandés.
- *Fréquence d'application.* Pour une répression PRÉVENTIVE TOUS LES 7 À 10 JOURS.
- *Taux d'application.* 103 à 115 grammes dans 4 à 20 litres d'eau par 100 mètres carrées, ou 3,4 à 3,8 onces avdp par 1000 pieds carrés. Quand les conditions favorisent fortement le développement de la maladie, utiliser le plus haut taux d'application, et l'intervalle le plus court entre chacun des traitements.
- *Contenu net.* Un paquet de 2,27 kilogrammes peut traiter de 21,000 à 23,000 pieds carrés.
- *Mélange en réservoir.* Daconil peut être mélangé en réservoir avec un seul des fongicides suivants — Banner MAXX ou Heritage MAXX.
- *Restrictions.* Ne pas mélanger dans le réservoir du pulvérisateur avec des produits anti–parasitaires, des agents tensio–actifs, ou des engrais, sauf si un usage antérieur s'est révélé physiquement compatible, efficace, et sans danger, dans les conditions d'utilisation prévues.