Anthragnose, la brûlure de la feuille.

Maîtrise chimique (É.-U. seulement).



Senator® 70WP WSB. Poudre mouillable.

- Fabricant. Nippon Soda Co., Ltd.
- Classification. Fongicide du groupe 1.
- *Matière active*. Contient 70 pour cent de thiophanate-méthyl.
- Mode d'action. Un fongicide SYS-TÉMIQUE À DIFFUSION ASCENDANTE (mobile dans le xylème, DIFFUSION ACROPÉTALE).
- *Usage*. Alterner avec des fongicides appartenant à d'autres groupes.
- Fréquence d'application. Effectuer une application TOUS LES 5 À 7 JOURS d'intervalle comme traitement PRÉVENTIF.
- Taux d'application. 60 grammes dans au moins 8 litres d'eau par 100 mètres carrés, ou 2 onces avdp par 1000 pieds carrés.
- Contenu net. Un paquet de 200 grammes peut traiter 3,333 pieds carrés. 4 x 8 x 200 grammes peut traiter 107,000 pieds carrés.
- Restrictions. Compatible avec la plupart des produits anti-parasitaires. Ne pas le mélanger avec de la chaux, ni d'autres matières alcalines.



Variétés résistantes.

Les variétés améliorées d'agrostide stolonifère qui possèdent une bonne à excellente résistance à l'Anthracnose sur verts.

' Alpha '

' Penn A-1 '

· 007 ·

'Penncross'
'PennLinks II'

Les variétés améliorées d'agrostide stolonifère qui possèdent une bonne à excellente résistance à l'Anthracnose sur allées.

' Alpha '

' PennLinks II '

' L–93 '

'SR-1119'

'Penneross'
'Penneagle II'

'SR-1150'

La variété améliorée d'agrostide stolonifère avec <u>la meilleure</u> résistance à l'Anthracnose sur <u>verts</u>.

Le meilleur pour les verts de golf.

