

La Plaque brune.



La plaque brune, avec les « anneaux de fumé » qui sont facilement visibles dans la matinée.

AUTRES NOMS.

Plaque brune rhizoctone. Grande plaque brune. *Rhizoctonia solani* (latin). « Brown Patch » (angl.).

ESPÈCES SUSCEPTIBLES.

Toutes les espèces de graminées.

LOCALISATION PROBABLE.

Verts et allées du terrain de golf.

IDENTIFICATION.

- Les dommages au gazon prennent une FORME DE GRANDES PLAQUES CIRCULAIRES AVEC LE CENTRE VERT.
- Un mycélium bleu-pourpre entoure le bord de la plaque le matin, surtout sur les verts. (Un « anneau de fumé ».)
- Le gazon peut aussi sembler faner et dépérir sans formes distinctes.



CONDITIONS FAVORABLES AU DÉVELOPPEMENT.

- Mauvaise circulation de l'air.
- L'utilisation excessive d'eau d'irrigation.
- L'utilisation excessive de l'engrais azoté soluble.
- Des températures hautes qui sont prolongées – excédant 27 °C (80 °F) le jour, et excédant 20 °C (68 °F) la nuit.
- Un excès de chaume.

MAÎTRISE CHIMIQUE.

- **Banner**® **MAXX**. 14 jours. Ne pas appliquer si des symptômes de la maladie sont présents. Préventif.
- **Compass** ^{MC} **50WG**. 14 à 21 jours. Préventif ou curatif.
- **Daconil**® **Aqua Résistant**. 7 à 14 jours. Préventif ou curatif.
- **Daconil**® **Ultrex**. 7 à 14 jours. Préventif ou curatif.
- **Heritage** ^{MD} **MAXX**. 14 à 28 jours. Préventif.
- **Rovral**® **Green GT**. 14 à 21 jours. Préventif ou curatif.
- **Senator**® **70WP WSB**. 5 à 7 jours. Préventif.

PRATIQUES PRÉVENTIVES.

- Évitez l'irrigation nocturne.
- Réduisez l'utilisation globale de l'eau d'irrigation.
- Utilisez un engrais avec un haut niveau d'azote de libération lente.
- Supprimez la rosée au cours des premières heures du matin.
- Réduisez l'excès de chaume.
- Coupez seulement lorsque les feuilles sont complètement sèches.