



La plaque estivale. Cette maladie peut affaiblir ou tuer le pâturin annuel, mais pas l'agrostide.

AUTRES NOMS.

Magnaporthe poae (latin). Tache estivale. « Summer Patch » (angl.).

ESPÈCE SUSCEPTIBLE.

Pâturin annuel. Cette maladie peut affaiblir ou tuer le pâturin annuel, mais PAS l'agrostide environnant.

LOCALISATION PROBABLE.

Verts et allées de terrain de golf.

IDENTIFICATION.

- Le gazon semble se faner et périr.
- Les racines deviennent brunes, minces, et fragiles.
- De vraies PLAQUES circulaires sont rarement formées sur le terrain de golf.



CONDITIONS FAVORABLES AU DÉVELOPPEMENT.

- Des conditions de sécheresse précédée de temps pluvieux.
- L'utilisation excessive d'eau d'irrigation.
- Un sol trop compacté.
- Une tonte qui est trop courte.

MAÎTRISE CHIMIQUE.

- **Banner MAXX.** Appliquez ce fongicide par mesure PRÉVENTIVE. Effectuez la première application lorsque la température du sol dépasse 16 °C à 5 cm de profondeur pendant 4 jours consécutifs. Effectuez une seconde application 30 jours plus tard. Une troisième application peut être nécessaire en cas de temps chaud et humide.
- **Heritage MAXX.** Commencez les traitements PRÉVENTIFS lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie. Appliquez la dose la plus faible à des intervalles de 14 jours, ou la dose la plus forte à des intervalles de 28 jours.
- Azote sous forme d'urée enrobée de soufre.

PRATIQUES PRÉVENTIVES.

- Effectuez l'humectage plusieurs fois par jour quand les températures sont élevées.
- Augmentez l'aération par prélèvement (carottage) au printemps et à l'automne.
- Augmentez la fréquence de l'aération par transperçement avec louchets solides en été.