

La Plaque fusarienne ou microdochienne

Maîtrise. Partie 1.



BANNER® MAXX
CONCENTRÉ ÉMULSIFIABLE.

- *Fabricant.* Syngenta.
- *Classification.* Groupe 3.
- *Matière active.* propiconazole.
- *Mode d'action.* Un fongicide **SYSTÉMIQUE LOCAL.**
- *Usage.* Ce fongicide doit être utilisé dans le cadre d'un programme **PRÉVENTIF** de répression des maladies. Appliquer à l'automne, ou au début du printemps, par temps frais et humide.
- *Fréquence d'application.* **TOUS LES 30 JOURS**, la durée de répression prévue lorsque le produit est utilisé dans le cadre d'un programme **PRÉVENTIF** de répression des maladies.
- *Taux d'application.* 51 à 103 mL dans 3 à 15 litres d'eau par 100 mètres carrés, ou 1,7 à 3,3 onces Impériales liquides par 1000 pieds carrés. N'utiliser la dose élevée qu'en cas de forte pression de la maladie. Lorsque les conditions favorisent un degré d'infection élevé, utiliser la dose la plus élevée.
- *Contenu net.* Un contenant de 3,78 litres peut traiter de 40,000 à 80,000 pieds carrés.
- *Mélange en réservoir.* Banner peut être mélangé en réservoir avec un seul des fongicides suivants – Daconil 2787, Daconil Ultrex, ou Heritage.
- *Restrictions.* Ne pas appliquer plus de 473 millilitres par 100 mètres carrés par saison, ou ne pas effectuer plus de **2** applications par saison.



COMPASS^{MC} 50WG
GRANULES DISPERSIBLES.

- *Fabricant.* Bayer.
- *Classification.* Groupe 11.
- *Matière active.* trifloxystrobine.
- *Mode d'action.* Un fongicide **PÉNÉTRANT** qui procure une action trans-laminaire grâce à son affinité élevée avec la couche cireuse de la surface de la plante, au mouvement de vapeur localisé et au dépôt de vapeur sur la plante.
- *Usage.* Appliquer au début du printemps et l'automne lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie et/ou lorsque la maladie est présente après la fonte des neiges. Comme traitement curatif, appliquer 2 ou 3 fois.
- *Fréquence d'application.* **PRÉVENTIVE** ou **CURATIVE, TOUS LES 14 JOURS.**
- *Taux d'application.* 3,8 grammes dans 4,1 à 8,1 litres d'eau par 100 mètres carrés, ou 0,12 once avdp par 1000 pieds carrés.
- *Contenu net.* 454 grammes peut traiter 130,000 pieds carrés.
- *Restrictions.* Alternier ce fongicide avec des fongicides appartenant à d'autres groupes. Ne pas faire plus de deux applications séquentielles avant d'effectuer au moins une application d'un fongicide classifié dans un autre groupe. Ne pas appliquer plus de 2,4 kg par hectare par saison (l'équivalent de six applications). Ne pas appliquer conjointement avec des surfactants aux organo-silicates. Ne pas retourner, ni permettre le retour des travailleurs, dans la zone traitée au cours du délai de sécurité de 12 heures.

